

SOPULITIEN ELÄINLÄÄKÄRIASEMA

Sopulitie 2 B, 00800 Helsinki

p. (09) 784713

www.sopulitieneläinlääkäriasema.fi

RAIVOTAUTI

Rabies (ihmisen vesikauhu, eläimen raivotauti) on tappava viruksen aiheuttama keskushermostosairaus, joka tarttuu pääasiassa tartunnan saaneen eläimen pureman välityksellä.

Puremasta voi kulua kuukausia, jopa vuosia taudin puhkeamiseen. Oireiden ilmaannuttua tauti johtaa hoidosta huolimatta kuolemaan. Tyypillisenä oireena nielun halvaantuminen (ihminen, tästä nimi "vesikauhu") ja eläimillä käytösmuutokset. Käytös ei aina muutu raivoiseksi, se voi muuttua myös mm. flegmaattiseksi.

Raivotaudin saanut eläin levittää virusta syljessään noin viikon ajan ennen kuolemaansa. Tällöin pureman lisäksi myös nuolaisu rikkinaiselle iholle tai limakalvolle riittää tartunnan saamiseen.

Villieläimet ja kulkukoira laumat levittävät tautia tehokkaasti. Lähinaapurimaissamme Venäjällä ja Virossa on raivotautitapauksia runsaasti – puhumattakaan kaukaisemmista ja eksoottisemmista maista. Näissä maissa kaikki kontaktit kulkukoiiriin (ja -kissoihin) ovat suuri riski. Koska taudin itämisaika voi olla pitkä, niin oireeton taudin kantaja voi päätyä löytöeläintarhalle, jossa sen saama raivotautirokotus ei sitä enää takautuvasti auta. Koira (tai kissa) päätyy Suomeen missä se muutamien viikkojen tai kuukausien kuluttua oudoin oirein kuolee. **KAIKKI TÄLLAISET ELÄIMET ON TOIMITETTAVA EVIRA:an RUUMIINAVAUKSEEN, JOTTA MAHDOLLINEN RAIVOTAUTI TODETAN.** Raivotautia ei voi enakkoon testata elävästä eläimestä.

Mikäli Evira toteaa ruumiinavauksessa raivotaudin, niin infektio lääkäri päättää kuinka laajalti eläimen viimeisinä päivinä tapaamat ihmiset aloittavat estohoidon (immunoglobuliinia ja rokotussarja). Ajoissa aloitettu estohoito pelastaa aina, oireiden ilmaannuttua on myöhäistä.

Mikäli mikä tahansa taustaltaan tuntematon tuontieläin nuolee rikkinaista ihoa tai puree, niin tartuntariski on tiedostettava. Jos kyseinen eläin on viikon päästä puremasta elossa ja terve, se ei ole tartuttanut raivotautia. Jos se on hiljaa haudattu tai mitään tietoja ei ole, on syytä keskustella infektio lääkäriin kanssa.

Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA:n viralliset ohjeet :

Jos raivotautiseksi epäilty eläin puree koiraa tai kissaa, jolla on voimassaoleva raivotautirokotus, on kunnaneläinlääkäri (= virkaeläinlääkäri) rokotettava eläin uudestaan ja määrättävä eläin pidettäväksi kytkettynä omistajan valvonnassa 45 päivän ajan. Kunnaneläinlääkäri on tarkastettava eläin 45 päivän kuluttua. Jos eläimellä ei ole raivotautiin viittaavia oireita, kunnaneläinlääkäri vapauttaa eläimen kytkennästä.

Jos pureman kohteeksi joutuneella koiralla tai kissalla ei ole voimassaolevaa raivotautirokotusta, kunnaneläinlääkäri on suositeltava koiran / kissan lopettamista. Jos omistaja ei halua lopettaa eläintä, eläin on eristettävä kunnaneläinlääkäriin hyväksymään paikkaan kuuden kuukauden ajaksi. Jos eristyksen aikana eläimessä ilmenee raivotautiin viittaavia oireita, tästä on ilmoitettava kunnaneläinlääkärille. Eristysajan lopussa kunnaneläinlääkäri on tarkastettava eläin ja jos siinä ei ole raivotautiin viittaavia oireita, kunnaneläinlääkäri vapauttaa eläimen eristyksestä.

Jos raivotautiepäily pureman aiheuttaneella eläimellä osoittautuu aiheettomaksi, kunnaneläinlääkäri voi vapauttaa kytkettäväksi tai eristettäväksi määrättyt eläimet ennen edellä kuvatun ajan päättymistä.

Raivotautidiagnoosi voidaan varmistaa vasta eläimen kuoleman jälkeen.